



PROPIEDADES

Pantobamin® es un complejo anabolizante, estimulante del apetito, de estructuración plástica del organismo para ser utilizado en los casos más rebeldes a los tratamientos tróficos.

La acción plástica y estimulante de los aminoácidos L-lysina y L-treonina se ha reforzado con la adición del factor nutricional, pantotenol y de las vitaminas del grupo B: riboflavina, cianocobalamina, piridoxina y tiamina, cuyas propiedades tónicas y estimulantes del crecimiento son bien conocidas.

La incorporación del dipéptido L-carnosina, cuyas propiedades estimulantes de la nutrición, de las funciones digestivas, absortivas y asimilativas, representa el complemento ideal al estímulo del apetito producido por la ciproheptadina a través de su acción directa sobre el centro cerebral mismo.

COMPOSICIÓN

Pantobamin® SOLUCIÓN

Cada ml contiene:

Ciproheptadina (DCI) clorhidrato	0,5	mg
L-Lysina base	62,5	mg
L-Carnosina	75	mg
L-Treonina	25	mg
Tiamina (DCI) nitrato	5	mg
Priridoxina (DCI) clorhidrato	2,5	mg
Cianocobalamina	2,5	mcg
Dexpantenol (DCI)	1,25	mg
Riboflavina (DCI) sodio fosfato	1,25	mg

Excipientes: sorbitol (E-420), metilparaben sódico, sacarina sódica, caramelo, ácido fosfórico c.s.p. pH 3,0-4,0, menta, esencia de limón, propilparaben sódico.

INDICACIONES

Inapetencia y desnutrición. Trastornos del crecimiento, astenia constitucional. Protector hepático. Convalecencia de enfermedades agudas y crónicas.

POSOLOGÍA

Lactantes: 0,3-0,7 ml, 2-3 veces al día.

Niños: 0,7 ml, 2-3 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Úlcera gástrica en actividad o alergia medicamentosa al grupo vitamínico B.

PRECAUCIONES

Debido al sabor agradable de la solución de **pantobamin®**, manténgalo fuera del alcance de los niños.

Este medicamento contiene sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

INCOMPATIBILIDADES

Con la I-DOPA por su incompatibilidad con la Vitamina B₆.

EFFECTOS SECUNDARIOS

A dosis altas puede aparecer somnolencia y una ligera sensación de mareo (debido a la ciproheptadina) que son de pequeña duración y desaparecen desde el momento que se vuelve a dosis terapéuticas.

INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Telf.: 91 562 04 20.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en un punto de recogida de residuos de medicamentos de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

PRESENTACIÓN

Pantobamin® SOLUCIÓN: frasco de 25 ml con dosificador.



Laboratorios MEDIX

Calle del Plástico, nº 5 nave 9.
Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>